

Voltaren

Emulgel

Diclofenaco Dietilamónico 1.16 % Gel



Venta libre

Industria Suiza

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE APLICAR EL MEDICAMENTO PORQUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA UD.

Siempre utilice este medicamento exactamente como se describe en el prospecto o como su médico o farmacéutico se lo indique.

¿QUÉ CONTIENE VOLTAREN EMULGEL?

Cada 100 g contiene:

Ingrediente Activo: Diclofenaco dietilamónico 1,16 g
Ingredientes Inactivos: Cetoestearil Eter Macrogol, Aroma Crema 45, Carbómeros, Cocoil Caprilcaprato, Dietilamina, Alcohol Isopropílico, Parafina Líquida, Propilenglicol, Agua Purificada.

ACCIONES

Analgésico (calma el dolor) – Antiinflamatorio (reduce la inflamación) de uso tópico.

¿PARA QUÉ SE USA VOLTAREN EMULGEL?

Está indicado para el alivio local del dolor y de las inflamaciones leves y ocasionales producidos por: pequeñas contusiones, golpes, distensiones u otras contracturas, lumbalgias y esguinces leves producidos como consecuencia de una torcedura.

¿CÓMO SE USA VOLTAREN EMULGEL?

Vía de administración: tópica.

Adultos y niños de 14 años o mayores.

Aplicar en el área dolorida 3 a 4 veces por día.

Instrucciones de Uso:

1. Antes del primer uso, remover el sello de seguridad. Para esto, desenroscar y remover la tapa. Utilizar el lado reverso de la tapa para insertar, girar y remover el sello del tubo.
2. Apretar suavemente el tubo para obtener una pequeña cantidad de gel. Aplicar en el área dolorida o inflamada, masajeando lentamente la piel. La cantidad necesaria puede variar dependiendo del tamaño del área dolorida o inflamada y usualmente variará entre el tamaño de una cereza y una nuez. Se puede experimentar un efecto levemente frío cuando se aplica el gel.
3. Luego de la aplicación, lavar las manos a excepción que las mismas sean el área que está siendo tratada.

Si el dolor y/o la inflamación no mejoran dentro de los 7 días o si empeoran consulte con su médico. Si Ud. olvidó aplicarse Voltaren cuando le correspondía, aplíquelo cuando lo recuerde y luego continúe aplicándolo como antes. No aplique una doble cantidad para compensar la aplicación que olvidó.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR VOLTAREN EMULGEL?

No use este medicamento si Usted:

- Es alérgico (hipersensible) al Diclofenaco o a otros medicamentos utilizados para el tratamiento del dolor, la fiebre o la inflamación (Por ejemplo: Ibuprofeno, Ácido Acetilsalicílico – una sustancia utilizada para prevenir la coagulación de la sangre-) o cualquier otro ingrediente de la formulación. Si no está seguro pregúntele a su médico o a su farmacéutico.
- Síntomas de una reacción alérgica a estas medicinas pueden incluir: sibilancia, dificultad para respirar (asma), erupción cutánea con ampollas o urticaria, hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, secreción nasal.
- Está embarazada, especialmente en los últimos tres meses de embarazo ya que el medicamento podría dañar a su bebé o causar problemas durante el parto.
- Está dando el pecho a su bebé
- Si Usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.
- En menores de 14 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR VOLTAREN EMULGEL?

Siempre use este medicamento como se describe en el prospecto incluido o según lo que su médico o su farmacéutico le hayan indicado.

- Conservar este prospecto. Puede necesitar leerlo nuevamente.
- Si Ud. necesita mayor información o tiene alguna pregunta, consulte a su médico y/o farmacéutico.
- Si Ud. tiene algún evento adverso, comuníquese al médico o al farmacéutico. Esto incluye cualquier posible evento adverso no listado en este prospecto.
- No aplicar sobre la piel que presente: cortes, heridas abiertas, sarpullido o eczema. Discontinúe el tratamiento si desarrolla sarpullido luego de aplicar el producto.
- Evitar aplicaciones en grandes áreas de la piel o por más tiempo que lo indicado, a menos que sea recomendado por el médico.

- Para uso externo únicamente. No usar en la boca. No tragar. Lavarse las manos luego de utilizarlo. Tenga cuidado de no introducir Voltaren en sus ojos; si esto sucede, lávelos bien con agua limpia. Consulte a su médico o farmacéutico si las molestias persisten.
- El gel contiene propilenglicol y benzoato de bencilo que pueden causar leves irritaciones cutáneas localizadas en algunas personas.
- Puede usarse un producto ortopédico deportivo (por ejemplo: rodillera, codera, etc.) o una venda utilizada habitualmente para lesiones como esguinces pero no puede usarse debajo de vendajes (plásticos) oclusivos.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO VOLTAREN EMULGEL?

Como todo medicamento Voltaren puede causar efectos adversos aunque no todas las personas los padezcan. Suspenda su uso y consulte inmediatamente a su médico si Ud. experimenta alguno de los siguientes signos de alergia:

- Erupción cutánea con o sin ampollas, urticaria, picazón, enrojecimiento o escozor de la piel.
- Sibilancias, dificultad para respirar o sensación de opresión en el pecho (Asma)
- Hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta.
- La piel puede ser más sensible al sol. Algunos de los posibles signos son quemaduras solares con picazón, hinchazón y ampollas.

Si Ud. tiene algún evento adverso consulte a su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible evento adverso no listado en este prospecto.

Si el dolor y/o la inflamación persisten por más de 7 días o empeoran, consulte a su médico.

¿QUÉ DEBO HACER SI USE UNA CANTIDAD EXCESIVA, O SI INGERÍ EL PRODUCTO?

- Si utilizó más gel de lo que debería, limpie el excedente con un pañuelo descartable.
- Si Ud. o un niño accidentalmente ingiere el gel, contacte a su médico inmediatamente.

Llame a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

- Hospital de Pediatría Dr. R. Gutiérrez –
Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas – Tel.: (011) 4654-6648 /
4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata –
Tel.: (0221) 451-5555.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame al 0800-777-1111.

ANMAT Responde: 0800-333-1234

CONSERVAR A TEMPERATURA INFERIOR A 25°C

MANTENER ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE Y

LA VISTA DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O

FARMACÉUTICO.

No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el tubo y en el estuche.

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 30, 60 y 100 g de gel.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 34.982

Elaborado en Suiza: Route L'Etraz 1260, Nyon.

Importado y distribuido por: GlaxoSmithKline Argentina S.A. Carlos Casares 3690, B1644BCD, Victoria, Buenos Aires, Argentina

Línea de atención al consumidor: 0800-888-6006

o escribanos a infomedica.consumo@gsk.com

Director Técnico: Eduardo D. Camino-Farmacéutico.

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: Julio 2017

AR 940298 – 6200000022015